

タシグナ_タシグナ

タシグナ

タシグナ

タシグナ **CML**

Image



タシグナ **CML**

タシグナ

タシグナ

タシグナ **CML**

Image



タシグナ® CML

タシグナ®は、慢性骨髄性白血病（CML）の治療に有効な薬です。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。

タシグナ®

タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。

Image




タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。

※タシグナ®は、TKI（チロシンキナーゼ阻害剤）の一種です。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。タシグナ®は、CMLの患者さんに、毎日1回、1錠（100mg）を、食事と一緒に、水で飲みます。

タシグナ®

2024

Image



CML

Image



CML

Image

[illegible]