

□□□□□□□□Top

□ □ □ □ □ □ □

[illegible]

Image



XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XX

XXXX

□□□□



□□□□**BC**□

□□□□**BC**□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□



□□□□□□**NEN**□

□□□□□□**NEN**□

□□□□□□□□□□□□□□**NET**□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

※加齢性硬化症と新たに診断したあるいは疑った時の検査のレコメ



IM検査により皮質結節、上皮下結節 (SEN)、遊走異常、上皮下 (SEGA) の存在を評価する。

加齢性硬化症関連神経精神症状 (TAND) *を評価する。

※診断までに発現はなくても、乳児期には点頭てんかんを見逃さない
可能に行う。

※加齢性硬化症と新たに診断したあるいは疑った時の検査のレコメ

XXXXXXXXTSC

XXXXXXXXTSC

XXXXXXXXXXXXXXXXTSCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

□□□□



XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

□□□□

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Source URL: *https://loadtest.pro.novartis.com/products/afinitor*