

[illegible]

Image

最大投与量は1回400mgを1日1回とする

エンレスト
投与開始

1日1回 200mg
(年齢、症状により適宜増減)

1日1回100mgからの開始、または開始の考慮が必要な患者さん

【低用量からの開始が必要な患者さん】

● 厳重な減塩療法中の患者 ● 血液透析中の患者 ● 利尿降圧剤を服用中の患者

【低用量開始の考慮が必要な患者さん】

● 重症腎機能障害患者 (eGFR < 30 mL/min/1.73m²) ● 高齢者

- 中等度肝機能障害患者 (Child-Pugh分類B)

上記に当てはまらない患者さんでも、患者さんの状態や他の降圧薬による治療状況などを考慮し、1日1回100mgからの開始をご考慮ください。

※ ACE 36

Image

低用量からの開始が必要な患者さん

利尿降圧剤を服用中



血液透析中



嚴重な減塩療法中



□□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□ -

10/10/2019

100mg200mg

Image



ACE 36

5.

5.5

202355

- 24 non-dipper
 -
-
-
-

20235

50mg100mg200mg

100mg200mg

Source URL:
https://loadtest.pro.novartis.com/products/entresto/high_blood_pressure/dosege