


□□□□□□□□

□□□□□□□□□□24□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image



□□□□□□□□□□2019□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□. □□□□□□□□□□2019JSH2019□, p.77, □□□□□□□□□□, 2019

Langenickel TH, Dole WP: Drug Discov Today Ther Strateg. 2012; 9(4): e131-e139

Volpe M, et al.: Clin Sci [Lond]. 2016; 130(2): 57-77


VIDEO

■ 8 ABPM 24 maSBP FAS
24 maSBP 200mg -13.44mmHg 400mg

平均値-14.99mmHg、エンレスト200mg群平均値-8.78mmHg、p<0.001、
ANCOVAの結果は、

8時間ABPMのmaSBPは、FAS

Image




エンレスト200mg群、エンレスト400mg群、オルメサルタン20mg群のA1306は、

200mg200mg

msSBPmsDBPFAS

Image



200mg200mg5.01mmHg95%-6.949%-3.0612mmHg

A1306

Rakugi H, et al.: Hypertens Res. 2022; 45(5): 824-833

4

200mg4.7400mg4.44.4

SAF

Image

	発現割合 (%)		
	エンレスト	オルメサルタン	
	200mg群 (n=387)	400mg群 (n=385)	オルメサルタン20mg群 (n=389)
副作用	18 (4.7)	17 (4.4)	17 (4.4)
重篤な副作用	1 (0.3) **	1 (0.3) **	1 (0.3) **
投与中止に至った副作用	2 (0.5) **	2 (0.5) **	4 (1.0) **
死亡	0	0	0
いずれかの群で2例以上に発現した副作用：発現割合 (%)			
回転性めまい	2 (0.5)	0	0
血中アラニンホスホゲータゼ増加	1 (0.3)	1 (0.3)	2 (0.5)
血圧上昇	0	0	2 (0.5)
高カリウム血症	2 (0.5)	1 (0.3)	0
体位性めまい	0	1 (0.3)	2 (0.5)
浮腫性めまい	2 (0.5)	0	0
そう痒症	0	2 (0.5)	0

*1**2*3*4

*5*6

A1306

Rakugi H, et al.: Hypertens Res. 2022; 45(5): 824-833

4

200mgmsSBP200mg

*1*2FAS*3SAF*41,161

24200mg400mg200mg1400mg20mg118

8msSBP

24msSBPmsDBPmsSBP

140mmHg20mmHgmsDBP90mmHg10mmHg

FASLOCF

msSBP200mg200mg200mg20mg2mmHgANCOVA

0.025ANCOVA0.05

msDBPANCOVA0.05

maSBPABPMANCOVA

msSBP/msDBPmsSBPmsSBP

2019SH2019*57575

*1msSBP150mmHg180mmHg

*2msSBP150mmHg180mmHgmsSBP140mmHg180mmHg

*3

*4

*5msSBP75130mmHg75140mmHgmsDBP7580mmHg7590mmHg

1020mg11510mg40mg

7.

7.3100mg110mg

17.1.3

7.4

A1306

Rakugi H, et al.: Hypertens Res. 2022; 45(5): 824-833

4

Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/entresto/high_blood_pressure/moa