

[illegible]


Limitation

- 50
-

Takahashi, A. et al. *J. Dermatol.* 2020; 47(3): 257-264


□□□□□□□PFS□

Image



□□□□□**OS**□

Image



全生存率 (OS) は、観察期間 3 年時点で 42.1% であり、

Limitation

- 観察期間が 50 週間未満であった患者は 50 例未満であった。
- 観察期間が 30 週間未満であった患者は 30 例未満であった。

結果

- 観察期間 50 週間未満の 44 例 (88%) は、観察期間 28 週間未満の 56 例 (52%) は、CPK が 12 週間未満の 24 例 (20%) 未満であった。
- 観察期間 8 週間未満の 8 例 (8%) は、観察期間 3 週間未満の 2 例 (2%) は、観察期間 2 週間未満の 2 例 (2%) 未満であった。
- 観察期間 30 週間未満の 30 例 (30%) は、観察期間 30 週間未満の 30 例 (30%) 未満であった。
- 観察期間 30 週間未満の 30 例 (30%) は、観察期間 30 週間未満の 30 例 (30%) 未満であった。

Takahashi, A. et al. *J. Dermatol.* 2020; 47(3): 257-264

全生存率 (OS) は、観察期間 3 年時点で 42.1% であり、

結果

Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/tafmek/mel/clinical_06