




STEP <b>1</b>	エンレスト錠100mg、4錠を乳鉢に取り、乳棒を用いて細かい粉状になるまで粉碎します。	
STEP <b>2</b>	メスシリンダーを用い、単シロップの必要量100mLの1/3量を加えて10分間混和します。	
STEP <b>3</b>	単シロップの必要量100mLの2/3量を加えて10分間混和し、懸濁液（4mg/mL）とします。	
STEP <b>4</b>	清潔なポリプロピレン（PP）製ボトルに調製した懸濁液を移します。ボトルの口または表面に液が残っていないことを確認し、キャップをしてください。最後に、ボトルをよく振り混ぜてください。	

Image

### STEP 1



エンレスト錠100mg、4錠を乳鉢に取り、  
乳棒を用いて細かい粉状になるまで粉碎します。

### STEP 2



メスシリンダーを用い、単シロップの必要量100mLの1/3量を加えて  
10分間混和します。

### STEP 3



単シロップの必要量100mLの2/3量を加えて10分間混和し、  
懸濁液（4mg/mL）とします。

### STEP 4



清潔なポリプロピレン（PP）製ボトルに調製した懸濁液を移します。  
ボトルの口または表面に液が残っていないことを確認し、  
キャップをしてください。  
最後に、ボトルをよく振り混ぜてください。

