

□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

日常生活に影響を与える
可能性のある症状

88%の患者さん
貧血 (Hb 13g/dL未満[男性]、
12g/dL未満[女性])が
みられる⁶。

83%の患者さん
生活に支障をきたす恐れのある
倦怠感がみられる²。

45%の患者さん
ヘモグロビン尿、または溶血による
濃い色の尿がみられる²。



生命を脅かす
可能性のある合併症

40%の患者さん
血栓性合併症がみられる⁶。

65%の患者さん
慢性腎臓病がみられる^{7,8}。

47%の患者さん
肺高血圧症がみられる⁹。

PNH ☐☐☐☐

PNH □□□□

PNH

--	--	--	--	--

□□□□

Life With PNH

PNHと私の大切な家族



Life With PNH

Life With PNH

PNH

5/5

□□□□



エキスパートに聞く

臨床成績解説

症例を読み解く

ガイドライン解説

□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□

□□□□ □□□□□□□□

メール配信サービス



presented by Novartis

HEMATOCAPSULE

HEMATOCAPSULE

□□□□

Source URL: <https://loadtest.pro.novartis.com/products/fabhalta/disease>