

Novartis Pharmaceuticals Corporation

Novartis Pharmaceuticals Corporation

Novartis Pharmaceuticals Corporation **2019** – **Novartis** –

Novartis Pharmaceuticals Corporation

Novartis Pharmaceuticals Corporation **6.15**
Novartis Pharmaceuticals Corporation **2019** **p.167**

Image

吸入薬の成分含有量は、**μg/回**

Image

	低用量	中用量	高用量
FP、BDP、CIC	～100	～200	～400
BUD	～200	～400	～800
BIS	～250	～500	～1,000

FPはフルチカソニド、BDPはベクロメタゾン、CICはクロニド、
 BUDはブデソニド、BISはベタメタゾン

吸入薬の成分含有量は、**SLM/回**または**FP**または**SFC**

Image

用量	低用量	中用量	高用量
FP/SLM (μg/日)	100/50	200/100	400～500/100
使用例	SFC 50エアゾール 1回1吸入 1日2回	SFC 100 DPI 1回1吸入 1日2回	中用量SFC+中用量ICS あるいはSFC 250DPI※ 1回1吸入 1日2回

※

SFC 50μgは、1回1吸入、1日2回、FP 50μg/SLM 25μg
 100μg DPIは、1回1吸入、1日2回、FP 100μg/SLM 50μg

吸入薬

吸入薬

吸入薬

吸入薬

吸入薬

[PFS](#)

[IC](#)

[IC](#)

[IgE](#)

Image



Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/asthma/guideline_child