

研究目的

研究の主要目的はQOLとAQLQを評価することである。

研究デザイン

GINA（Global Initiative for Asthma）2002年版のステップ4の治療法（>1,000µg/日 CFC- BDP）
¹のβ2刺激薬（β2agonist）を482名に、419名に

1. 研究の主要目的はBDPを800µg/日とする。

研究結果


研究1の結果は、IgE濃度が0.016mg/kg per IU/mL、IgE濃度が400IU/mL、28週間、経過観察（16週間）

研究結果

研究2の結果は、primary ITT（PITT）の結果は、AQLQ、ANCOVAの結果は、

研究結果

Image



[illegible]

<□□□□□>

- □□□□

- FEV1.0 80%
-
- 1

<□□□□□>

[illegible]

<□□□□>

7.5 16

PITT 28 p=0.042

増悪頻度

(回)

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.91

0.68

p=0.042

プラセボ群 (n=210)

ゾレ酸群 (n=209)

群	増悪頻度 (回)
プラセボ群 (n=210)	0.91
ゾレ酸群 (n=209)	0.68

28

27 11.0% 24 10.1% 24 9.8% 22 9.3% 3 1.3% 13 5.3% 1 0.4% 11 4.5% / / / / / / / / C 1 0.4% 4 1.7% / 1 0.4%

3.  INNOVATE 

□□□□□

□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

[PFS](#)□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

[IC](#)□□□□□□□□□□□□

[IC](#)□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

[IgE](#)□□□□□□

Image



Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/asthma/clinical_03