

□□□□□□[HARRIER]

AMD

HARRIER C002

□□□□48□□

□□□□□

48mg 13.5 50/370 2mg 16.0 59/369
6mg 2.2 8/370 2mg 2.4 9/369 2.7
10/370 2.2 8/369
6mg 3 6mg 2
6mg 1 2mg 1
6mg 1
6mg 7 3
1 2mg 2 1

111

48mg
6mg
1mg
3mg
2mg
4mg
6mg
1mg

Image

有害事象の概要 [48週]		
	発現例数 (%)	
	ベオピュ6mg群 (n=370)	アフリベルセプト2mg群 (n=369)
治療対象眼での有害事象	122 (33.0)	119 (32.2)
重篤な有害事象	9 (2.4)	4 (1.1)
治験薬との関連あり	7 (1.9) ※1	1 (0.3) ※2
治験薬投与手技との関連あり	2 (0.5) ※3	0 (0.0)
投与中止に至った有害事象	8 (2.2)	4 (1.1)
眼以外の有害事象	219 (59.2)	211 (57.2)
重篤な有害事象	35 (9.5)	43 (11.7)
治験薬との関連あり	1 (0.3) ※4	0 (0.0)
治験薬投与手技との関連あり	1 (0.3) ※5	0 (0.0)
投与中止に至った有害事象	4 (1.1)	0 (0.0)

1 治験薬投与手技との関連あり

※1 治験薬投与手技との関連あり

※2 治験薬投与手技との関連あり

※3 治験薬投与手技との関連あり

※4 治験薬投与手技との関連あり

※5 治験薬投与手技との関連あり

96

96 治験薬投与手技との関連あり 6mg 19.5 72/370 治験薬投与手技との関連あり 2mg 23.0 85/369 治験薬投与手技との関連あり 6mg 3.5 13/370 治験薬投与手技との関連あり 2mg 4.9 18/369 治験薬投与手技との関連あり 3.2 12/370 治験薬投与手技との関連あり 2.4 9/370 治験薬投与手技との関連あり 3.3 12/369 治験薬投与手技との関連あり 6mg 3 治験薬投与手技との関連あり 6mg 2 治験薬投与手技との関連あり 6mg 1 治験薬投与手技との関連あり 2mg 1 治験薬投与手技との関連あり 6mg 1 治験薬投与手技との関連あり 2mg 1 治験薬投与手技との関連あり 6mg 2 治験薬投与手技との関連あり 6mg 1 治験薬投与手技との関連あり 2mg 1 治験薬投与手技との関連あり 6mg 1 治験薬投与手技との関連あり 6mg 9 治験薬投与手技との関連あり 3 治験薬投与手技との関連あり 1 治験薬投与手技との関連あり 2mg 4 治験薬投与手技との関連あり 1 治験薬投与手技との関連あり

96 治験薬投与手技との関連あり 6mg 1.6 6/370 治験薬投与手技との関連あり 2mg 0.5 2/369 治験薬投与手技との関連あり 2 治験薬投与手技との関連あり 6mg 2 治験薬投与手技との関連あり 6mg 4 治験薬投与手技との関連あり 2mg 7 治験薬投与手技との関連あり 6mg 1 治験薬投与手技との関連あり 2mg 1 治験薬投与手技との関連あり 6mg 1 治験薬投与手技との関連あり

Image

有害事象の概要 [96週]		
	発現例数 (%)	
	ベオビュ6mg群 (n=370)	アフリベルセプト2mg群 (n=369)
治療対象眼での有害事象	174 (47.0)	176 (47.7)
重篤な有害事象	13 (3.5)	6 (1.6)
治験薬との関連あり	8 (2.2)※1	2 (0.5)※2
治験薬投与手技との関連あり	4 (1.1)※3	1 (0.3)※4
投与中止に至った有害事象	13 (3.5)	6 (1.6)
眼以外の有害事象	282 (76.2)	272 (73.7)
重篤な有害事象	69 (18.6)	85 (23.0)
治験薬との関連あり	1 (0.3)※5	1 (0.3)※6
治験薬投与手技との関連あり	0 (0.0)	0 (0.0)
投与中止に至った有害事象	8 (2.2)	3 (0.8)

- 1
- ※1
- ※2
- ※3
- ※4
- ※5
- ※6

Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/beovu/amd/clinical_06