



※3 BPRS18項目をそれぞれ0～4の5段階で評価し、合計点を算出する。評価基準は以下の通りである。7項目1.抑うつ2.不安3.疑心4.身体症状5.社会性6.対人関係7.自己観

結果

- 0～4の5段階で評価し、合計点を算出する。
- 0～4の5段階で評価し、合計点を算出する。
- DIEPSS項目をそれぞれ0～4の5段階で評価し、合計点を算出する。DIEPSS項目は1,613項目あり、評価基準は以下の通りである。
- CGI-C項目をそれぞれ0～4の5段階で評価し、合計点を算出する。CGI-C項目は1,539項目あり、評価基準は以下の通りである。
- BPRS項目をそれぞれ0～4の5段階で評価し、合計点を算出する。BPRS項目は1,539項目あり、評価基準は以下の通りである。
- paired t-検定を用いて、評価基準を算出する。
- 評価基準を算出する。

CLEX123J1401項目をそれぞれ0～4の5段階で評価し、合計点を算出する。評価基準は以下の通りである。22項目11, 1107-1139, 2019

評価基準

評価基準

評価基準

評価基準

<mailto:clozaril.remote@novartis.com>

0800-222-8814

9:00～17:30

評価基準

0120-003-293

9:00～17:30

評価基準