

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

REVEAL **D2303** ^{1,2}


ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

ルセントイス0.5mg群とレーザー群との比較

Image



[illegible]

01

□2 □□□□□□□□□□□□□□□□

3

4 112

□5 □□□□□□□□□□1mm□□□□□□□□□□

□ □

Image

項 目		症例数(%)		
		ルセンティス 0.5mg群 N=133	ルセンティス 0.5mg +レーザー群 N=132	レーザー群 N=131
性別	男性	81 (60.9)	67 (50.8)	75 (57.3)
	女性	52 (39.1)	65 (49.2)	56 (42.7)
年齢	< 55 歳	35 (26.3)	30 (22.7)	27 (20.6)
	55～ 64 歳	51 (38.3)	55 (41.7)	54 (41.2)
	65～ 74 歳	41 (30.8)	34 (25.8)	36 (27.5)
	≥ 75 歳	6 (4.5)	13 (9.8)	14 (10.7)
	平均値±標準偏差	60.7 ± 9.37	61.2 ± 10.52	61.5 ± 9.68
最高矯正視力スコア (文字)	n	133	132	129
	平均値±標準偏差	58.8 ± 10.93	58.5 ± 10.50	58.4 ± 10.56
中心領域網膜厚* ^{1,2} (μm)	n	106	110	102
	平均値±標準偏差	419.2 ± 152.34	429.9 ± 158.25	394.7 ± 122.31
眼圧(mmHg)	n	133	132	129
	平均値±標準偏差	15.0 ± 3.06	15.0 ± 3.15	15.0 ± 3.12
糖尿病タイプ	I 型	1 (0.8)	2 (1.5)	2 (1.5)
	II 型	132 (99.2)	130 (98.5)	129 (98.5)
HbA1c (%)	n	133	131	131
	平均値±標準偏差	7.5 ± 1.02	7.4 ± 1.05	7.5 ± 1.10
糖尿病罹病期間(年)	n	133	132	131
	平均値±標準偏差	11.21 ± 8.207	11.33 ± 8.055	11.34 ± 8.856
DME 罹病期間(年)	n	132	131	129
	平均値±標準偏差	1.24 ± 1.521	1.36 ± 2.089	1.51 ± 1.963
DME の種類* ²	局所性	30 (22.6)	39 (29.5)	48 (36.6)
	びまん性	90 (67.7)	85 (64.4)	76 (58.0)
	不明	13 (9.8)	8 (6.1)	7 (5.3)

* 1 中心窩を中心とする直径 1mm の円内の平均網膜厚

* 2 他の中央読影センターによる読影結果も同様の結果であった

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 / 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Image

安全性解析対象 集団	ルセンチス 0.5mg 群 (N=133)	ルセンチス 0.5mg +レーザー群 (N=132)	レーザー群 (N=128)
注射回数の平均値 (標準偏差)	7.8(2.9)回	7.0(3.1)回	7.4(3.1)回
注射回数の分布 n (%)			
1～3回	16(12.0)	23(17.4)	17(13.3)
4～6回	29(21.8)	36(27.3)	38(29.7)
7～9回	46(34.6)	41(31.1)	36(28.1)
10～12回	42(31.6)	32(24.2)	37(28.9)

□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□

Image

安全性解析対象 集団	ルセンティス 0.5mg 群 (N=133)	ルセンティス 0.5mg +レーザー群 (N=132)	レーザー群 (N=128)
実施回数の平均値 (標準偏差)	1.5 (0.9)回	1.5 (0.9)回	1.9 (1.0)回
実施回数の分布 n (%)			
1回	87 (65.4)	89 (67.4)	55 (43.0)
2回	32 (24.1)	30 (22.7)	44 (34.4)
3回	5 (3.8)	7 (5.3)	17 (13.3)
4回	9 (6.8)	4 (3.0)	11 (8.6)
> 4回	0 (0.0)	2 (1.5)	1 (0.8)

Image

項 目		症例数(%)		
		ルセンティス 0.5mg群 N=116	ルセンティス 0.5mg +レーザー群 N=118	レーザー群 N=111
性別	男性	73 (62.9)	70 (59.3)	58 (52.3)
	女性	43 (37.1)	48 (40.7)	53 (47.7)
年齢	< 55 歳	24 (20.7)	14 (11.9)	13 (11.7)
	55～ 64 歳	41 (35.3)	42 (35.6)	53 (47.7)
	65～ 74 歳	40 (34.5)	53 (44.9)	31 (27.9)
	≥ 75 歳	11 (9.5)	9 (7.6)	14 (12.6)
	平均値±標準偏差	62.9 ± 9.29	64.0 ± 8.15	63.5 ± 8.81
最高矯正視力スコア (文字)	平均値±標準偏差	64.8 ± 10.11	63.4 ± 9.99	62.4 ± 11.11
中心領域網膜厚* (μm)	n	114	116	109
	平均値±標準偏差	426.6 ± 118.01	416.4 ± 119.91	412.4 ± 123.95
眼圧 (mmHg)	n	108	107	106
	平均値±標準偏差	15.5 ± 2.45	15.5 ± 2.51	15.2 ± 2.77
糖尿病タイプ	I 型	13 (11.2)	15 (12.7)	13 (11.7)
	II 型	103 (88.8)	102 (86.4)	97 (87.4)
HbA1c (%)	n	114	117	108
	平均値±標準偏差	7.23 ± 1.085	7.50 ± 1.099	7.28 ± 1.105
糖尿病罹病期間 (年)	n	115	118	111
	平均値±標準偏差	15.23 ± 9.909	14.62 ± 9.835	12.93 ± 9.024
DME 罹病期間 (年)	n	115	118	111
	平均値±標準偏差	1.80 ± 1.982	1.99 ± 3.138	1.58 ± 1.964
DME の種類	局所性	64 (55.2)	68 (57.6)	53 (47.7)
	びまん性	45 (38.8)	46 (39.0)	52 (46.8)

*中心窩を中心とする直径 1mm の円内の平均網膜厚

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 / 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

Image

安全性解析対象 集団	ルセンティス 0.5mg 群 (N=115)	ルセンティス 0.5mg +レーザー群 (N=120)	レーザー群 (N=110)
注射回数の平均値 (標準偏差)	7.0(2.81)回	6.8(2.95)回	7.3(3.22)回
注射回数の分布 n (%)			
1～3回	16(13.9)	23(19.2)	19(17.3)
4～6回	37(32.2)	34(28.3)	32(29.1)
7～9回	40(34.8)	35(29.2)	22(20.0)
10～12回	22(19.1)	28(23.3)	37(33.6)

/

Image

安全性解析対象 集団	ルセンティス 0.5mg 群 (N=115)	ルセンティス 0.5mg +レーザー群 (N=120)	レーザー群 (N=110)
実施回数の平均値 (標準偏差)	1.9(1.07)回	1.7(0.89)回	2.1(1.04)回
実施回数の分布 n (%)			
1回	57(49.6)	67(55.8)	40(36.4)
2回	29(25.2)	36(30.0)	30(27.3)
3回	15(13.0)	10(8.3)	27(24.5)
4回	13(11.3)	6(5.0)	13(11.8)
>4回	1(0.9)	1(0.8)	0

1 Mitchell P., et al.: Ophthalmology, 118(4), 615(2011) LUCM00702

COI

RESTORE D2301E1

-

0.5mg 83 11 13.3% 0.5mg+ 83 17 20.5
0.5mg 59 11 18.6
0.5mg 0.5mg+
0.5mg 8 9.6% 5
6.0 7 11.9 0.5mg 83 3 3.6% 0.5mg+
83 5 6.0
0.5mg 59 3 5.1
0.5mg 1 0.5mg+
2 1
0.5mg 1

- 24

Image

④ 網膜厚が1mm以上増加した患者

網膜厚が1mm以上増加した患者

Image

	RESTORE試験の 投与開始からの 通算した期間	ルセンティス 0.5mg群 ^{*5} (n=83)	ルセンティス 0.5mg＋ レーザー群 ^{*5} (n=83)	シャム注射 ＋ レーザー群 ^{*5} (n=74)
RESTORE試験	投与開始日～11ヵ月後	7.4回	7.5回	0.0回
RESTORE 継続試験	投与開始12～23ヵ月後	3.9回	3.5回	4.1回
	投与開始24～35ヵ月後	2.9回	2.5回	2.4回
通算	投与開始日～35ヵ月後	14.2回	13.5回	6.5回 ^{*6}

⑤ RESTORE試験の結果

⑥ 12～35ヵ月後の結果

1. Schmidt-Erfurth U., et al.: Ophthalmology, 121(5), 1045(2014) LUCF00074
COIに関する開示事項は、本報告の添付資料4に記載されている。

網膜厚が1mm以上増加した患者

網膜厚が1mm以上増加した患者

網膜厚が1mm以上増加した患者1例、0.5mg/0.05mLのルセンティス1回投与による

網膜厚が1mm以上増加した患者

1. 1例、1回投与による網膜厚が1mm以上増加した患者
2. 網膜厚が1mm以上増加した患者1例
3. 網膜厚が1mm以上増加した患者1例
4. 網膜厚が1mm以上増加した患者1例
5. 網膜厚が1mm以上増加した患者1例

Image



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: *<https://loadtest.pro.novartis.com/products/lucentis/dme/clinical>*