

40kg 1 2mg/kg 40kg 1 150mg 8 8
1 2mg/kg 150mg 1 8mg/kg 600mg
8

② CRP 30mg/L = 3mg/dL SAA 30mg/L = 30μg/mL

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□□□□5□□

Image

n=19, n(%)又は平均値(S.D.)


□□□□□□□□□□24□□□□□48□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□18□14□77.8□□□19□16□84.2□□□□□□□□

再燃がみられなかった患者

A horizontal bar chart titled '再燃がみられなかった患者' (Patients with no recurrence). The y-axis lists two groups: '24週 (n=18)' and '48週 (n=19)'. The x-axis is labeled '非再燃率' (Non-recurrence rate) and ranges from 0 to 100 (%). Two blue bars represent the data: the 24-week group has a rate of 77.8%, and the 48-week group has a rate of 84.2%. A bracket on the right side of the bars is labeled '[主要評価項目]' (Primary evaluation item).

グループ	非再燃率 (%)
24週 (n=18)	77.8%
48週 (n=19)	84.2%

Image



4週間15週間29週間

15週間9週間15週間6週間
29週間10週間29週間7週間

Image


	15日までに増量しなかった患者 (n=9)		29日までに増量した患者 (n=10)	
	n		n	
	あり	なし	あり	なし
寛解*	6	3	7	3
臨床的寛解	9	0	10	0
血清学的寛解	6	3	7	3

※15週間15週間29週間29週間

5週間

8週間

Image



8

19331

1 D2308

1.A2102